

# Батькам про імунопрофілактику

## Поліомієліт. Як захистити свою дитину?

**Поліомієліт** - це високозаразне захворювання, спричинене поліовірусом. Він вражає нервову систему і може викликати невиліковний параліч або навіть смерть всього за декілька годин. Вірус поліомієліту є дуже заразним і не зважає на соціальний статус, матеріальні статки чи кордони. Будь-яка дитина, імунізована не в повній мірі, знаходиться в зоні ризику та становить небезпеку для інших дітей.

**Вірус передається** від людини до людини.

**Джерелом** інфекції є хворі або вірусоносії.

**Потрапляє** він в організм через рот з водою або їжею, які були забруднені фекаліями зараженої особи.

Вірус розмножується в кишечнику і виділяється з фекаліями зараженої особи, через які він може бути переданий іншим людям.

Кожен 200-тий інфікований поліовірусом залишається паралізованим на все життя. Серед тих, кого було паралізовано, 5%-10% помирають внаслідок ураження вірусом м'язів, що забезпечують дихання.



**Ліків проти поліомієліту НЕ ІСНУЄ!**

**Єдиним ефективним захистом є ВАКЦИНАЦІЯ.**

**Першими симптомами поліомієліту є:**

- лихоманка;
- втома;
- головний біль;
- блювота;
- ригідність шиї;
- біль у кінцівках, неможливість стати на ніжки.

**Увага, шановні батьки!** Терміново звертайтеся за медичною допомогою, якщо у дитини, раніше не вакцинованої проти поліомієліту, спостерігаються вищезгадані симптоми.

**Ліквідація поліомієліту – це наше спільне майбутнє.**

## ЩО ТАКЕ ПРАВЕЦЬ І ЯК ВІД НЬОГО ВБЕРЕГТИСЯ?

### ЯК ЗБУДНИК ПОТРАПЛЯЄ В ОРГАНІЗМ?



Під час та після пологів



Після опіків



В результаті травм, навіть незначних

Збудник правця особливо розповсюджений у ґрунті теплих і вологих регіонів, а також знаходиться у кишкової людини і усіх травоядних тварин



Правець – це інфекційне захворювання, збудник – бактерія **Clostridium tetani**

Потрапляючи в рану, бактерія виробляє **тетаноспазмін** – надпотужний нейротоксин

Токсин блокує нейромедіатори в центральній нервовій системі і викликає **судоми**

### ХАРАКТЕРНІ ПРОЯВИ ПРАВЦЯ

У вакцинованих:



у місці проникнення збудника – посмикування м'язів (легкий перебіг хвороби)

У невакцинованих:

Спазми м'язів обличчя



Судоми м'язів спини



Раптові судоми усього тіла



Спазми голосової щілини, зупинка дихання



**СМЕРТНІСТЬ** від правця сягає

**70%**

в залежності від віку, лікування, загального стану хворого

Без госпіталізації та інтенсивного лікування кількість летальних випадків серед людей найстаршого і наймолодшого віку –

**100%**

### КОМУ ЗАГРОЖУЄ ПРАВЕЦЬ?



У групі ризику – всі вікові групи

### ЯК УБЕЗПЕЧИТИСЯ ВІД ПРАВЦЯ?



Єдиний спосіб – щеплення протиправцевою вакциною

### ЩО У ВАКЦИНІ?



Анатоксин правцевий - знешкоджений токсин, у відповідь на який організм виробляє захисні антитоксини

### ЯК ТРЕБА ВАКЦИНУВАТИСЯ?



За календарем у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років, 16 років та надалі кожні 10 років

Ревакцинація необхідна для вироблення нейтралізуючих антитіл до токсину

Ефективність і дієвість протиправцевих вакцин сягає практично **100%**

Джерело: [http://www.who.int/immunization/Tetanus\\_28May08\\_RU.pdf](http://www.who.int/immunization/Tetanus_28May08_RU.pdf)

**Правець загрожує будь-якій невакцинованій людині • У випадку з правцем колективного імунітету немає ВСТИГНІТЬ ЗАХИСТИТИ СЕБЕ І СВОЇХ ДІТЕЙ!**

# ЩЕПЛЕННЯ ВІД ДИФТЕРІЇ І ПРАВЦЯ ПОТРІБНІ ЛЮДЯМ РІЗНОГО ВІКУ



МІНІСТЕРСТВО  
ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ



## АКДП або АаКДП

Маленькі діти

- 2, 4, 6 місяців
- 18 місяців

## АДП

Старші діти

- 6 років

## АДП-м

Підлітки, дорослі

- 16, 26 років
- і кожні 10 років



## Гостомельська амбулаторія ЗП-СМ

...

Вчора в 18:21 · 🌐

Коли ми чуємо з різних СМІ про випадки небезпечних хвороб в Україні, здеться, що вони далеко, нас не стосується, або взагалі "змова фарммафії, аби збагатити я на вакцинах".

Сьогодні дворічна гостомельська дитина вже шосту добу виборює своє життя в реанімації обласної лікарні. Діагноз - Правець. Дитина введена у штучну кому, аби не відчувати болю від судом. На її ручки та ніжки накладено шини, аби судоми не ломали її кістки. Аби вона дихала, їй зроблено отвір у горлі та вставлена трубочка (трахеостома), підключена до апарату штучної вентиляції.

Дитина не має жодного щеплення від праця (АКДП), бо батьків лякала індійська вакцина. Та наврядчи триденні температура, біль в місці щеплення та навіть шкутильгання страшніше того, що відбувається з нею зараз.

Не лякайтеся видуманих міфів про вакцинацію! Робіть вчасно щеплення собі та своїм дітям! Захистіть себе та своїх рідних від справжньої небезпеки!



## ЩО ТАКЕ КІР

Кір – це дуже заразне інфекційне захворювання, спричинене вірусом. Кір розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, коли інфікована людина кашляє або чхає.

На кір може захворіти як дитина, так і доросла людина в будь-якому віці.

## СИМПТОМИ КОРУ



- висока температура тіла
- кашель
- нежить
- почервоніння очей
- рясне висипання на шкірі у вигляді червоних плям, що проявляється на шкірі обличчя і потім розповсюджується на все тіло.

### КІР МОЖЕ СУПРОВОДЖУВАТИСЯ:

- діареєю (проносом)
- пневмонією (запаленням легень)
- енцефалітом (запаленням мозку)

**Кір небезпечний для вагітних і може спричинити передчасні пологи.**

## ВАКЦИНАЦІЯ – єдиний ефективний спосіб попередити кір.

**КІР МОЖНА ПОПЕРЕДИТИ  
ЗАВДЯКИ ЩЕПЛЕННЮ.**



Вакцина КПК, забезпечує імунітет проти одразу трьох інфекційних захворювань: кору, краснухи та паротиту (свинки).

**Згідно з календарем щеплень, для захисту від кору потрібно дві дози вакцини:**

- в 12 місяців
- в 6 років.

**ВАКЦИНА КПК БЕЗПЕЧНА  
ТА ЕФЕКТИВНА.**



Вакцину КПК (виробництва GlaxoSmithKline) держава надає безкоштовно.

Шановні батьки, якщо ваша дитина своєчасно не вакцинована проти кору, обов'язково зверніться до вашого лікаря та зробить пропущені дози.

**Дорослі** також можуть захворіти на кір. В дорослому віці кір переноситься дуже важко. Якщо ви не вакциновані від кору або не хворіли на кір, зверніться до лікаря, щоб зробити необхідне щеплення.

# ДИФТЕРІЯ



## ЗОНА РИЗИКУ

ДІТИ ТА ДОРОСЛІ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ЩЕПЛЕННЯ



## ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ



ПОВІТРЯ  
КОНТАКТ З ХВОРИМ



ПРЕДМЕТИ,  
ЗАРАЖЕНІ БАКТЕРІЯМИ



БРУДНІ РУКИ, ПОСУД,  
ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА

## СИМПТОМИ



ПІДВИЩЕННЯ  
ТЕМПЕРАТУРИ



БІЛЬ У ГОРЛІ  
ПРИ КОВТАННІ



ЗБІЛЬШЕННЯ  
МИГДАЛИН ЧИ  
ЛІМФАТИЧНИХ  
ВУЗЛІВ



СЛАБКІСТЬ



СІРО-ЖОВТІ  
ПЛІВКИ НА  
МИГДАЛИНАХ,  
В ГОРЛІ, ЗАДНІЙ  
СТІНЦІ ГОРТАНІ

## УСКЛАДНЕННЯ



СИЛЬНА  
ІНТОКСИКАЦІЯ



ІНВАЛІДНІСТЬ



СЕРЦЕВА  
НЕДОСТАТНІСТЬ



СМЕРТЬ

## ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ



ДІТЯМ:

У ВІЦІ 2, 4, 6, 18 МІСЯЦІВ  
ТА У 16 РОКІВ


ДОРОСЛИМ:

КОЖНІ 10 РОКІВ

# Календар профілактичних щеплень

Чинний, затверджений Міністерством охорони здоров'я України в 2018 році

МІНІСТЕРСТВО  
ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ



\*Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) | \*\*Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

[vaccination.com.ua](http://vaccination.com.ua) | [moz.gov.ua](http://moz.gov.ua)

Імунізація проти низки захворювань може проводитися комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до поліклінік.